

Tutorat Les Nuits Blanches

2023/2024

Semestre 4

Promo 2022/2025

**UECP 16 – Psychiatrie générale de l'adulte
Partiel Blanc**

✿

Tuteur Rédacteur

Sourd Dorian

✿

Référent Partiel

Sourd Dorian

✿

Durée : 20 minutes

Troubles des conduits alimentaires

QCM 1

- A. Le sex ration est de 1 pour l'anorexie mentale
- B. Les deux types d'anorexie mentale sont le type restrictif et purgatif
- C. L'anorexie mentale est caractérisée par des épisodes récurrents d'hyperphagie
- D. Un patient boulimique peut être dénutrie
- E. La prise en charge psychiatrique et nutritionnelle sont les 2 axes de prise en charge de la boulimie et de l'hyperphagie

Trouble de stress post-traumatique (TSPT)

QCM 2

- A. On peut parler de TSPT si on observe un syndrome d'évitement consécutif à un événement traumatique
- B. Le syndrome de répétition correspond à un trouble de l'humeur
- C. Les altérations négatives des cognitions correspondent notamment à une amnésie traumatique
- D. Pour parler de TSPT, on doit avoir tous les éléments suivants : syndrome de répétition, syndrome d'évitement, hyperactivation neurovégétative, altérations négatives des cognitions et de l'humeur.
- E. Après un événement traumatique, il y a 10% de chance d'avoir un Trouble de Stress Aigu

Principes de psychopharmacologie et traitement par stimulation cérébrale

QCM 3

- A. Antipsychotiques et neuroleptiques sont synonymes
- B. Il existe des antipsychotiques de 1^{ère} et de 2^e génération.
- C. Ils peuvent être prescrits dans le cadre d'épisode dépressifs ou de trouble bipolaires
- D. En cas de fièvre sous antidépresseur, on recherche un syndrome malin des neuroleptiques
- E. Un antidépresseur peut être prescrit dans le cadre d'un trouble anxieux.

Principes de psychopharmacologie et traitement par stimulation cérébrale

QCM 4

- A. Les thymorégulateurs peuvent avoir un effet secondaire à type de tremblements
- B. Lorsqu'une femme veut avoir un enfant, on arrête le sel de lithium car il est tératogène
- C. Lorsqu'on prescrit un anxiolytique benzodiazépine, on le fait souvent en bithérapie
- D. Les anxiolytiques ont souvent des effets secondaires anticholinergiques : constipation et galactorrhée par exemple
- E. Les sujets privilégiés dans les Electrostimulations Cérébrales (ECT) sont le sujet âgé et la femme enceinte

Troubles de la personnalité

QCM 5

- A. La personnalité correspond à l'association entre le tempérament et l'évolution sociale
- B. Tous les individus ont des troubles de personnalité. Les troubles de personnalité sont rigides, durables et source de souffrance.
- C. Il y a 3 grandes catégories de troubles de personnalité : Cluster A, B et C

- D. Le cluster A correspond aux troubles de personnalité bizarres et excentriques comme avec la personnalité-obsessionnelle compulsive
- E. Le Cluster B contient le trouble de personnalité Borderline et Narcissique

Troubles psychotiques

QCM 6

- A. Le trouble psychotique chronique correspond quasi-exclusivement à une perturbation du soi par rapport à autrui
- B. Les symptômes fréquents du trouble psychotiques sont peuvent être résumer par le syndrome négatif et la désorganisation
- C. Les hallucinations font parties du syndrome négatif
- D. Le trouble délirant est un trouble psychotique non-schizophrénique
- E. Les objectifs de la thérapie sont notamment l'arrêt total des hallucinations pour espérer un retour à domicile

Troubles anxieux et apparentés

QCM 7

- A. Un Trouble Anxieux Généralités (TAG) est associé à des troubles de l'attention et de la concentration
- B. Pour être associés à un TAG, les troubles doivent durer au moins 3 mois
- C. Une attaque de panique correspond à un trouble panique sous-jacent
- D. L'agoraphobie est un trouble panique
- E. Les antidépresseurs sont couramment utilisés dans le traitement pharmacologique de l'attaque de panique.

QCM 8 – Concernant les Troubles Obsessionnel-Compulsifs (TOC)

- A. Le craving (pulsion à consommer une substance) est une obsession d'un Trouble Obsessionnel-Compulsif
- B. Une compulsion est un acte répétitif et excessif exécuté pour soulager une angoisse
- C. Dans le TOC, il y a un mécanisme de pensée magique
- D. Il y a autant de femmes touchées que d'homme (le sex ratio est de 0)
- E. La restructuration cognitive permet rationaliser les idées surévaluées sous-tendant l'anxiété

Troubles de l'humeur

QCM 9

- A. Un Episode Dépressif Caractérisé (EDC) contient 2 symptômes majeurs : Anhédonie (diminution de la motivation) et humeur triste
- B. Un épisode dépressif signe un trouble dépressif
- C. L'épisode maniaque est caractérisé par une élévation de l'humeur avec notamment une réduction du temps de sommeil associée à une asthénie diurne
- D. Sur le plan clinique, un trouble bipolaire se définit dans le temps par une alternance d'épisode maniaque et d'épisode dépressif
- E. Sur le plan clinique, un trouble bipolaire se définit dans le temps par une alternance d'épisode maniaque et d'hypomanie

QCM 10

- A. L'évaluation du risque suicidaire se fait en fonction des facteurs de risque

- B. L'évaluation du risque suicidaire se fait à partir de la recherche d'accès à un moyen létal
- C. Les idées suicidaires sont fréquentes dans le trouble bipolaire
- D. Le suicide est la première cause de mortalité pour les 25-34 ans
- E. Demander si un patient a des idées suicidaires a un risque d'en faire émerger